

TRAUMA OBSTÉTRICO: HEMATOMA VULVAR

Obstetric trauma: hematoma vulvar

Maura Carolina Bustillo U.¹ Dinora Yasmin Fuentes A.²

¹Médico Ginecóloga Obstetra Hospital Escuela Universitario, Profesor titular III Universidad Nacional Autónoma de Honduras

²Médico General. Clínica Materno Infantil Santa Rosa de Lima, Villa de San Francisco, Francisco Morazán.



Paciente de 28 años Gestas 5 Partos 5; un control prenatal en CESAMO, quien es referida a Clínica Materno infantil con historia de 4 hrs de evolución de haber tenido parto domiciliario, sin ayuda, manifestando la paciente que al tratar de expulsar la placenta nota aumento rápido de volumen en vulva en un lapso de 30 minutos por lo cual acude, evidenciándose al examen hematoma de labio mayor y menor izquierdo. El edema y hematoma vulvar puerperal, son complicaciones raras del periodo postparto; las dos condiciones tienen factores de riesgo similares y se sabe que ocurren juntas.- El resultado es típicamente favorable ya que ambos reabsorben con mecanismos de perfusión locales. Las recomendaciones para el manejo varían basadas en evidencia limitada y experiencia anecdótica.¹

Recibido para publicación el 03/14, aceptado el 06/14

Dirección para correspondencia: Dra. Maura Carolina Bustillo
E-mail dramacabus@yahoo.es

REFERENCIA

1. J Low genital tract Dis. 2014 May 14